



# ZOLFO VENTILATO STELLA FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

ZOLFO VENTILATO STELLA Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N° 13244 del 14/05/2009



ATTENZIONE

## COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
Zolfo puro (esente da selenio)  
Coformulanti q.b. a

g 98,5  
g 100

## Partita n.

Taglie: Kg. 1 Kg 5, Kg 10, Kg 25  
Altra Taglia: kg 250\*

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
Via Lungomolo n. 16 - 90018Termini Imerese (Palermo)  
Tel. +39 0918141004

OFFICINA DI PRODUZIONE:  
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
90018 Termini Imerese (Palermo)

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE: P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi. **P101** - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**REAZIONE: P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P332+P313** -In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

**CONSERVAZIONE: P401** - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**

## INFORMAZIONI MEDICHE

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

## IMPIEGO

Trattamenti a secco contro:Oidio della vite in prefioritura e postfioritura; Mal bianco delle pomacee e drupacee; Oidio delle colture ortive, durante tutto il ciclo vegetativo; Oidio del Nocciolo.

## DOSE INDICATIVA:

25-30 Kg/ha.

## COMPATIBILITÀ

Si raccomanda di non usare il prodotto in miscela con calce, oli bianchi. Non è compatibile (o miscibile) con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con oli minerali, con Captano.

**AVVERTENZA:** Deve essere utilizzato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

## FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap;

PERE: Buona Luigia D'Avranche, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;

VITE: Sangiovese.

Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

## Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da kg 250 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/05/2009 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30/05/2016;